

経皮的肝動脈塞栓術(TAE)を受けられる方へ(治療前)

患者氏名

月日（日時）	／		／	
経過（病日等）	入院日		治療日（治療前）	治療日（治療後）
達成目標	入院生活について理解できる 治療について理解できる		身体的準備ができています	疼痛のコントロールができています 発熱がない 血圧が安定している 安静を守ることができる
内服 点滴			点滴をします 吐き気止めを飲むことがあります	→ 
処置 検査	採血 心電図モニター 胸部・腹部レントゲン 			
活動安静度	 院内自由です 			<細い管> 帰室後：ベッド上安静。足首運動を行ってください。 2時間後：ベッドを30度UPします 3時間後：医師が穿刺部を確認後、トイレまで歩行可 （初回は看護師が付き添います） <太い管> 帰室後：ベッド上安静。足首運動を行ってください。 2時間後：ベッドを30度UPします 5時間後：医師が穿刺部を確認後、トイレまで歩行可 （初回は看護師が付き添います）
清潔	除毛後、シャワー浴できます		シャワー浴できません	
排泄	制限はありません 			ベッド上での排泄です
食事	午前の治療：前日の22時から食事・飲水はできません 午後の治療：前日は、制限ありません。翌日の朝食は自身で半量分を摂取して下さい。朝食後からは食事・飲水はできません。			
説明	・病棟看護師より入院生活について説明があります ・薬剤師より服薬歴・持参薬等の確認があります			
備考				

注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。

社会福祉法人 三井記念病院 消化器内科(ID:31)

1ページ目

経皮的肝動脈塞栓術(TAE)を受けられる方へ(治療後)

月日（日時）	/	/	/	/	/
経過（病日等）	治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目	退院日
達成目標	疼痛のコントロールができています 発熱がない 転倒しない	疼痛のコントロールができています 発熱がない 転倒しない	疼痛のコントロールができています 発熱がない 転倒しない	疼痛のコントロールができています 発熱がない 転倒しない	日常生活の注意点について理解 できる
内服 点滴	点滴をします → 				
	吐き気止めを飲むことがあります				
処置 検査	採血 				
活動安静度	病棟内自由です	 院内自由です 			
清潔	清拭します	シャワー浴可能です			
排泄	 制限はありません 				
食事	制限はありません 				
説明					・看護師より退院後の生活につ いて説明があります 
備考					