

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を受けられる患者さんへ

患者氏名

月日(日時)	／		／		／	／	
経過(病日等)	入院	検査当日(検査前)	検査当日(検査後)	検査後1日目	(検査後2日目～)	退院	
達成目標	入院生活について理解できる 検査の必要性について理解できる	検査を受けることかできる	発熱などの症状がなく、痛みのコントロールができています	発熱などの症状がなく、痛みのコントロールができています	発熱などの症状がなく、痛みのコントロールができています	痛みのコントロールができています 日常生活の注意点について理解できる	
内服注射		点滴をします (点滴の針をいれます)		点滴をします (点滴の針をぬきます)	ERCP検査(入院2日目)の結果により、2回目のERCP検査をおこなう場合があります その場合は、医師より説明があります		
処置検査	血液検査をします 胸腹部のレントゲン検査をします 心電図検査をします	検査をおこないます	酸素吸入します 血液検査をします	血液検査をします 状況に応じて、胸腹部のレントゲン検査をします			
活動安静度	院内自由です 	検査前まで院内自由です	検査3時間はベッドで安静です 翌朝までトイレ歩行は可能です	病院内は自由です 		病院内は自由です	
清潔	シャワー浴できます	シャワー浴できません		シャワー浴できます			
排泄	トイレで排泄できます → 						トイレで排泄できます
食事	食事ができます	朝から禁食です 水分(水・白湯・お茶)のみとれます	麻酔から覚め、医師の指示により飲水できます	医師の指示により昼食から食事ができます			食事ができます
説明	医師より検査について説明します 看護師より入院生活について説明します 薬剤師が服薬歴・持参薬等の確認をします					退院後の生活について説明します 	
備考							

注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。