




# 大腸癌化学療法(mFOLFOX6+Pmab療法)を受けられる方へ

患者氏名 \_\_\_\_\_

| 月日(日時)    | ／ ( )  | ／ ( )  | ／ ( ) ~ / ( )  | ／ ( )  |
|-----------|--|--|--|--|
| 経過(病日等)   | 入院日  | 化学療法日  | 化学療法後  | 退院日  |
| 達成目標      | 入院生活や治療について理解できる   | 目立った副作用の症状がない<br>副作用などの異常時に報告ができる<br>こまめにうがい・手洗いができる   | 目立った副作用の症状がない<br>副作用などの異常時に報告ができる<br>こまめにうがい・手洗いができる | 退院後の生活について理解できる<br>目立った副作用の症状がない                                 |
| 説明        | 主治医より治療の内容について説明します<br>看護師より入院生活について説明します<br>薬剤師より服薬歴・持参薬等の確認をします  |  |  | 退院後の生活について説明します<br>(皮下埋込み型カテーテル(CVポート)の<br>管理、抗がん剤の副作用について説明します) |
| 内服        | 吐き気があるとき・眠れないとき・痛みがあるときは、看護師までお声かけください  |  |  |  |
| 注射        |  | 抗がん剤点滴(mFOLFOX6 + Pmab療法)<br>約46時間、持続注入します  |  |  |
| 処置        |  |  | 4日目<br>看護師付き添いのもと、ポート針を抜きます                          |  |
| 検査        | 採血をします                                    |  |  |  |
| 活動<br>安静度 | 院内は自由です                               |  |  |  |
| 清潔        | シャワー浴できます<br>うがい液でうがいをしましょう  |  |  |  |
| 排泄        | トイレで排泄できます<br>排泄物からの抗がん剤の飛散を予防するため、男性も排泄は座って行いましょう   |  |  |  |
| 食事        | 医師の指示に従ってください  |  |  |  |
| 備考        | 初回の場合は、退院までの間に、外来化学療法室オリエンテーションがあります / 看護師より、自己抜針指導があります   |  |  |  |

注1 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。