

大腸内視鏡検査/内視鏡的粘膜切除術を受けられる方へ(3日間入院)

検査前薬剤:ピコプレップ

【患者用パス】

患者氏名

月 日	/	/	/	
	入院日	検査/治療当日（検査/治療前）	検査/治療当日（検査/治療後）	退院日
達成目標	入院生活について理解できる 発熱がない	発熱がない	下血や腹痛など腹部症状がない 疼痛コントロールが出来る	緊急時の対処方法が分かる 下血や腹痛など腹部症状がない
内服 点滴	下剤を飲みます 	吐き気止め・下剤を飲みます 	点滴をします	
処置・検査	採血をします 			
活動安静度	院内自由です 	院内自由です 	病棟内自由です 	院内自由です 
清潔	シャワー浴ができます	シャワー浴ができます 		シャワー浴ができます
排泄	制限はありません 			
食事	昼・夕:低残渣食 19時以降、絶食です。	朝から禁食です。 水・白湯・お茶のみ飲めます	食事はできません	腹痛・血便なければ五分粥から食事を再開します
説明	・病棟看護師より入院生活について説明があります ・薬剤師より服薬歴・持参薬等の確認があります 	・禁飲食について説明します		・退院後の生活について説明します 
備考	・下剤を飲んだら「水、お茶、スポーツ飲料」を1～2時間をかけて1.5L服用しましょう。 ・心疾患のある方は、スポーツ飲料ではなく、「水もしくはお茶」を服用しましょう。 	・起床時に「水、お茶、スポーツ飲料」をコップ2杯分服用しましょう。 ・下剤を飲んだら、「水、お茶、スポーツ飲料」を1～2時間をかけて1.5L服用しましょう。 ・心疾患のある方は、スポーツ飲料ではなく、「水もしくはお茶」を服用しましょう。		

注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。 社会福祉法人 三井記念病院 消化器内科 (ID:4121)