

原発性副甲状腺機能亢進症の手術を受けられる方へ:術前【患者用パス】

患者氏名

月日(日時)	／ ()	／ ()
経過(病日等)	入院日(手術前日)	手術当日(手術前)
達成 目標	入院生活について理解できる 手術について理解できる	身体的準備ができている
説明	主治医より入院・手術について説明します 看護師より入院生活について説明します 麻酔科医・手術室看護師の訪問があります 服薬歴・持参薬等の確認を薬剤師がします	
内服	眠れない時は看護師までお声かけください。内服ができます。	
注射		
検査		
処置		
活動 安静度	院内自由です	
清潔	 シャワー浴できます	シャワー浴できません
排泄	特に制限はありません	
食事	手術前日の21時以降禁食です 飲水はできます 	1件目手術の方:朝 8:30までアルジネードウォーター摂取可 朝 9:00までOS-1/飲水可 2件目手術の方:朝10:30までアルジネードウォーター摂取可 朝11:00までOS-1/飲水可 3件目手術の方:朝11:30までアルジネードウォーター摂取可 朝12:00までOS-1/飲水可
備考		

注1 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。

社会福祉法人 三井記念病院 乳腺内分泌外科(ID:4180)

原発性副甲状腺機能亢進症の手術を受けられる方へ：術後【患者用パス】

患者氏名

月日(日時)	／ ()	／ ()	／ ()	／ ()	／ ()
経過(病日等)	手術当日(手術後)	手術後1日	手術後2日	手術後3日	退院日
達成目標	麻酔から覚醒し、呼吸状態が安定している 看護師介助のもと、トイレまで歩ける	疼痛のコントロールができています むせこみがない	疼痛のコントロールができています		創部に発赤・腫脹・出血・浸出液などの症状がない 退院後の生活について理解できる
説明	術後HCUへ帰室します	一般病棟へ帰室します			退院後の生活について説明します
内服	手術の翌朝より痛み止めを内服します ※しびれがある時、痛みがある時、吐き気がある時、眠れない時は看護師までお声かけください				
注射	点滴をします 手術後1日目の朝食を半分以上食べられた方は点滴を終了します				
検査		採血をします 			
処置	酸素をつけます 創部に管が入っています				
活動 安静度	ベッド上安静です 寝返りは打てます 術後3時間以降、トイレ歩行できます 初回は看護師が付き添います	院内自由です 			
清潔	シャワー浴できません	清拭をします 	下半身シャワーができます	創部の管が抜けたら、全身シャワーができます	
排泄	術後3時間以降、トイレ歩行できます				
食事	術後6時間以降、飲水できます 初回の飲水時は看護師が介助します 食事はできません 	朝から食事ができます			
備考					

注1 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。

社会福祉法人 三井記念病院 乳腺内分泌外科(ID:4180)