

## 冠動脈形成術・ステント留置術(PCI)2泊3日を受けられる方へ【患者用パス】

患者氏名

| 月 日       | ( )   | ( )  | ( )   | ( )  |
|-----------|---|--|---|--|
|           | 治療前日  | 治療当日(治療前)  | 治療当日(治療後)   | 退院日  |
| 達成目標      | 入院生活や手術・治療の理解ができる<br>疑問があれば質問ができる   | 身体的準備が来ている   | 息苦しさがない<br>疼痛・出血がない   | 疼痛・出血がない<br>発作時の対処方法を知っている   |
| 内服・点滴     | 翌日午前に治療をする方は<br>状態に応じて点滴をします   | 点滴をします    | 状態に応じて内服や点滴を行います                                   | 状態に応じて内服や点滴を行います<br>点滴をはずします   |
| 処置        | 細菌の侵入を防ぐため剃毛をします   |  | 出血ないように穿刺部の圧迫をします   | 穿刺部位に絆創膏を貼ります  |
| 検査        | 採血をします<br>心電図検査をします<br>身長、体重、腹囲を測定します<br>胸部のレントゲンを撮ります                 |  | 心電図を装着しています<br>採血をします<br>心電図検査をします  |  |
| 活動<br>安静度 | 病院内を自由に歩行できます    | 車椅子でカテーテル室へ移動します    | 車椅子またはストレッチャーで病室へ移動します<br>穿刺部位により安静度が変わります<br>詳しくは病室へ移動後、看護師より説明します   | 穿刺部位の圧迫がはずれたら<br>病院内を自由に歩行できます<br>※初回歩行は看護師が付き添います  |
| 清潔        | 入浴またはシャワー浴ができます<br>※主治医の指示で入浴ができない場合は<br>体を拭きます                        |  |   | テープの跡を拭きます    |
| 排泄        | 尿量を測定します   | 主治医の判断で尿の管を入れることがあります<br>尿量を測定します  | 安静が解除されるまでベッド上で排泄をします<br>尿量を測定します                  | 尿の管をいれた場合、尿の管をぬきます<br>尿量を測定します   |
| 食事        | 病院食以外は食べないようにしてください<br>午前治療の場合は前日の夕食後より絶食<br>です<br>飲水できます            | 午前治療の場合は朝絶食です<br>午後治療の場合は朝食は食べられます、昼絶食<br>です<br>飲水できます(飲水量を測定してください)  | 合併症が無いと医師が判断したらお食事ができます<br>飲水できます(飲水量を測定してください)  |  |
| 説明        | 主治医と担当看護師より今回の入院につ<br>いて説明します<br>服薬歴・持参薬等の確認を薬剤師がします<br>禁食について説明します  |   | 治療後の安静について説明します                                  | 服薬指導があります<br>主治医と担当看護師より治療結果と<br>退院後の生活について説明します  |
| 備考        | ネームバンドを装着します  | カテーテル室では担当の看護師が治療や準備な<br>どをお手伝いします<br>義歯・湿布・指輪・ネックレスなどの貴金属類は外<br>してください  |   | ネームバンドをはずします<br>10時頃退院になります                       |

注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。

社会福祉法人 三井記念病院 循環器内科