



原発性副甲状腺機能亢進症の手術を受けられる方へ：術前【患者用パス】

患者氏名

月日(日時)	／ ()	／ ()
経過(病日等)	入院日(手術前日)	手術当日(手術前)
達成目標	入院生活について理解できる 手術について理解できる	身体的準備ができている
説明	主治医より入院・手術について説明します 看護師より入院生活について説明します 麻酔科医・手術室看護師の訪問があります 服薬歴・持参薬等の確認を薬剤師がします	
内服	眠れない時は看護師までお声かけください。内服ができます。	
注射		
検査		
処置		
活動 安静度	 院内自由です 	
清潔	 入浴できます	入浴できません
排泄	特に制限はありません	
食事	手術前日の21時以降禁食です 飲水はできます	1件目、2件目手術の方： 朝6時までアルジネードウォーター摂取可 朝7時までOS-1飲水可 3件目手術の方：朝8時30分まで アルジネードウォーター摂取可 朝9時30分までOS-1飲水可
備考		

注1 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご留意ください。

社会福祉法人 三井記念病院 乳腺内分泌外科(ID:4180)

原発性副甲状腺機能亢進症の手術を受けられる方へ：術後【患者用パス】

患者氏名

月日(日時)	／ ()	／ ()	／ ()	／ ()	
経過(病日等)	手術当日(手術後)	手術後1日	手術後2日	手術後3日	退院日
達成目標	麻酔から覚醒し、呼吸状態が安定している 看護師介助のもと、トイレまで歩ける	疼痛のコントロールができてい むせこみがない	疼痛のコントロールができてい		創部に発赤・腫脹・出血・浸出液などの 症状がない 退院後の生活について理解できる
説明	術後HCUへ入室します	一般病棟へ入室します			退院後の生活について説明します 
内服	手術の翌朝より痛み止めを内服します → ※しびれがある時、痛みがある時、吐き気がある時、眠れない時は看護師までお声かけください 				
注射	点滴をします 手術後1日目の朝食を半分以上食べられた方は点滴を終了します				
検査		採血をします 			
処置	酸素をつけます 創部に管が入っています →				
活動 安静度	ベッド上安静です 寝返りは打てます 術後6時間以降、トイレ歩行できます 初回は看護師が付き添います	院内自由です  			
清潔	入浴できません	清拭をします 	下半身シャワーができます	創部の管が抜けたら、 全身シャワーができます	
排泄	術後6時間以降、トイレ歩行できます				
食事	術後6時間以降、飲水できます  初回の飲水時は看護師が介助します 食事はできません	朝から食事ができます			
備考					

注1 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。

社会福祉法人 三井記念病院 乳腺内分泌外科(ID:4180)